

Impfkalender 2019 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Mai 2019



impfen-info.de
Wissen, was schützt.



S Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)



K Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)



E Erwachsene
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	2 Monate	U4 3 Monate	U6 4 Monate	U7 11-14 Monate	15-23 Monate	2-4 Jahre	U9 5-6 Jahre	J1 9-14 Jahre	15-16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahre	ab 60 Jahre
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N>	A1	A2	A2	N	A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie		6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	N>	A1	A2	A2	N	A (alle 10 Jahre)	
Keuchhusten (Pertussis)		6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	N>	A1	A2	A2	N	A ^d	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)						N>						
Kinderlähmung (Poliomyelitis)						N>>	A		N	ggf. N>
Hepatitis B						N>>					
Pneumokokken		G1 ^b		G2	G3	N							S ^f
Rotaviren	G1 ^a	G2	(G3)										
Meningokokken C					G (ab 12 Monaten)		N>>>>		
Masern					G1	G2	N>>>>	S ^e	
Mumps					3-fach-Impfung MMR	3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N>>>>		
Röteln					G1	G2	N>>>>		
Windpocken (Varizellen)					G1	G2	N>>>>		
HPV (Humane Papillomviren)									G1+G2 ^c	N ^c>		
Grippe (Influenza)									Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere				S (jährlich)
Gürtelrose (Herpes zoster)													G1+G2 ^h

U Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder

G Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)

S Standardimpfung

J Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

N Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)

A Auffrischung

a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

c 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich

d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

f Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

h Zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten.